

Übersicht Spezialmodelle

Ortho Rehab Total Ortho Rehab 3 Ortho Open Ortho Sandale









Indikationen

Konservative oder postoperative Behandlung nach Achillessehnenrupturen

Operativer Behandlung von Achillessehnentendinopathien, Haglund-Exostosen

Bei chronische Achillessehnenbeschwerden

Postoperativer Einsatz nach Bandnaht/-rekonstruktionen, Malleolarfrakturen, Korrekturosteotomien, Arthrodese, Arthroplastik

Konservative Therapie von Weichteilverletzungen und knöchernen Verletzungen an Mittel- und Rückfuss (z.B. schwere OSG-Distorsionen)

Konservative Therapie bei chronischen OSG-Instabilitäten sowie bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen (z.B. Arthrose)

Einsatz bei diversen Geburtsgebrechen

Einsatz bei diversen Geburtsgebrechen

Einsatz bei spastischen und schlaffen Lähmungen

Konservative Therapie von Weichteilverletzungen und knöchernen Verletzungen an Mittel- und Rückfuss (z.B. schwere OSG-Distorsionen)

Konservative Therapie bei chronischen OSG-Instabilitäten sowie bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen (z.B. Arthrose) Einsatz bei diversen Geburtsgebrechen

Einsatz bei spastischen und schlaffen Lähmungen

Konservative Therapie von Weichteilverletzungen und knöchernen Verletzungen an Mittel- und Rückfuss (z.B. schwere OSG-Distorsionen)

Konservative Therapie bei chronischen OSG-Instabilitäten sowie bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen (z.B. Arthrose)

